



APRÈS LA VACCINATION BCG

LES EFFETS SECONDAIRES DU VACCIN BCG

VOUS VENEZ DE FAIRE VACCINER VOTRE ENFANT

Les réactions allergiques au vaccin sont **rare**s et **surviennent dans les minutes qui suivent la vaccination**.

Juste après l'injection, **une petite papule pâle peut se créer et la peau prendre un aspect de peau d'orange**. Cette réaction disparaît en quelques minutes. Habituellement, le BCG n'entraîne pas de réaction générale : ni fièvre, ni fatigue.

Dans les 48 premières heures, il peut apparaître une rougeur et une induration.



Dans les semaines qui suivent la vaccination, **il peut exister une induration** autour de la zone piquée, avec parfois une ulcération et/ou un écoulement et/ou un ganglion sous le bras.

Cette lésion peut mettre plusieurs mois à cicatriser.

Dans de rares cas, il est possible que l'ulcération devienne plus profonde, qu'un abcès se forme ou que le ganglion sous le bras s'infecte.

Cette réaction s'accompagne alors de fièvre.

Si cela se produit, consultez votre médecin.



LES 7 RÈGLES D'OR

1



Laissez le bras vacciné à découvert le plus souvent possible, pour faciliter la cicatrisation.

2



Mettez des vêtements qui ne serrent pas à l'endroit de la piqûre.

3



S'il s'écoule un peu de liquide à l'endroit de la piqûre, nettoyez au savon et à l'eau puis appliquez simplement une compresse sèche ou un pansement.

4



N'APPLIQUEZ AUCUNE POMMADE, NI CREME, NI TALC
à l'endroit de la piqûre ou sur le ganglion.

5



Ne donnez aucun antibiotique.

6



Le bain et la douche sont autorisés dès le jour de la vaccination.

Évitez les baignades en piscine ou à la mer s'il s'écoule un peu de liquide à l'endroit de la piqûre.

7



Consultez votre médecin si :

- L'induration (zone dure au toucher) autour de l'endroit de la piqûre mesure plus de 3 cm et/ou s'accompagne de fièvre
 - Votre enfant est gêné dans ses mouvements
- Le ganglion apparu sous le bras (aisselle) est visible à l'œil nu et ramolli

| CONTACT

Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT)

par email : clat@ch-tourcoing.fr
par téléphone : 03.20.69.49.02

Ouvert du lundi au vendredi | 8h30 à 16h30



WWW.CH-TOURCOING.FR

155, RUE DU PRÉSIDENT COTY | B.P.619 | 59208 TOURCOING CEDEX | TEL : 03.20.69.49.49

Centre Hospitalier de Tourcoing - CLAT - Communication - Juin 2024 - Modèle n°470 | Crédit illustrations : Freepik